

Els efectes de les drogues

coneix els possibles efectes adversos i les malalties per l'abús de les drogues

Valera, José Antonio

Editorial: Adhana Ediciones


ISBN: 8436005171278

Páginas: lamina

Dimensiones: 21.5 x 30.5 cm

Encuadernación: Lámina tamaño folio plastificada

PVP.: 3,95 €



ELS EFECTES DE LES DROGUES
Coneix els possibles efectes adversos i les malalties per l'abús de les drogues

Alcohol	Cocaïna/ Crack	DXM (metahamfetamina)	Éxtasi (MDMA)	Heroïna	Inhalants	Marihuana	Metamfetamina	Analgèsics	Sonants de Trancor, Litzants i Recipients	Estimulants i Recipients	Esteroides	Tabac
Alcohol Nom: etanol comercial Formes de presentació: líquid amb tres principals varietats: vi, cervesa i licors. Com s'utilitza: És una droga. Passada aigua. El que els addictes han sentit: Amb normalitat, fins i tot en les més elevades. Perills principals: L'abús provoca alteracions múltiples: hepàtica i cardiovascular. De on s'abasteix: 1 de cada 2 consumidors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una "droga" molt comuna i molt perniciosa. El consum excessiu pot provocar la mort.	Cocaïna/ Crack Nom: COC, COCA, COCAÏNA, CRACK, CRACK, etc. Formes de presentació: Pols blanca cristal·lina, pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Per l'ús recreatiu, provoca sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 10 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Compulsió per a consumir més i més, sensacions de eufòria, etc. Important saber: La cocaina és una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	DXM (metahamfetamina) Nom: DXM, MDX, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 7 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: L'abús de DXM provoca dany cerebral i cardíac.	Éxtasi (MDMA) Nom: AMF, MDA, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 8 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: Pot ser letal. És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Heroïna Nom: BHL, BHLA, etc. Formes de presentació: Pols blanca, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 30 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Ràpidament desenvolupa dependència. Important saber: La heroïna és una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Inhalants Nom: MEBREX, etc. Formes de presentació: Líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalat. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 4 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Fàcilment desenvolupa dependència. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Marihuana Nom: BHC, etc. Formes de presentació: Pols, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 10 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Metamfetamina Nom: BML, etc. Formes de presentació: Pols blanca, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 12 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Analgèsics Nom: COD, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 7 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Sonants de Trancor, Litzants i Recipients Nom: BFR, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 13 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Estimulants i Recipients Nom: BML, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 9 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Esteroides Nom: BML, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 18 abúsadors és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.	Tabac Nom: BML, etc. Formes de presentació: Pastilles, líquid, etc. Com s'utilitza: Inhalada o injectada. El que els addictes han sentit: Sensacions de eufòria i augmenta la velocitat de la respiració i el ritme cardíac. Perills principals: Pot causar dany cerebral, renal, hepàtic i cardíac. De on s'abasteix: 1 de cada 1 abúsador és addictiu i el 10% mor per l'abús. Síntoma d'abús: Dificultat per a dormir, cansament, irritabilitat, nerviosisme, mal de cap, etc. Important saber: És una droga molt perniciosa i pot provocar la mort.

SINOPSIS

Lámina plastificada, ilustrada a todo color, que incluye un gráfico de los diferentes tipos de drogas, con los efectos adversos y enfermedades que produce por el efecto de ellas...